

# L'écureuil roux.

exposé de Dyanéle et Nina, mars 2007

## **La carte d'identité**

Famille : sciuridé

Ordre : rongeur.

Longueur : 18 à 25 cm

Poids : 200 à 350 g

Pelage : du jaunâtre au roux, du brun foncé au noir, dessous blanc.

En hiver son poil devient gris

Longévité : de 6 à 7 ans

Description : queue touffue

## **Habitat :**

Forêts tropicales, bois, prairies et jardins.

## **Partie de corps :**

Pattes à doigts longs effilés avec griffes ; 4 doigts à l'avant, 5 à l'arrière

Queue: 17 à 18 cm.

Longueur: 20 cm à 22 cm sans la queue

## **Les prédateurs :**

Prédateurs terrestres : le pékan (martre), le loup-cervier, la belette et le lynx roux...

Prédateurs aériens : la buse à épaulettes rousses, l'autour, l'épervier brun et la crécerelle d'Amérique, la chouette est aussi un prédateur de l'écureuil.

## **La reproduction :**

La reproduction : une portée au printemps, après 3-6 semaines de gestation nombre de petits 1 ou 2 écureuils pour certaines, 9 ou plus pour d'autres espèces.

A la saison des amours qui peut aller de décembre à septembre, la femelle pousse de petits cris aigus pour attirer le mâle. Ils s'accoupleront 1 ou 2 fois par an. Après 38 jours de gestation, la femelle donnera naissance à une portée de 4 ou 5 petits êtres roses, nus, aveugles et sourds. Mais pas pour bien longtemps, car au bout de 3 semaines un doux pelage les recouvrira. Après avoir tété leur mère durant 9 à 12 semaines, ils auront atteint leur taille adulte et seront autonomes. A eux à présent d'imiter papa et maman lorsque l'automne arrive.

**Les espèces :**

**Les différents écureuils arboricoles :**

L'écureuil nain du Gabon, l'écureuil d'Ambert, l'écureuil géant des Indes, l'écureuil de l'Hudson, l'écureuil volant Nord américain, l'écureuil de Prévost, ...

**Les différents écureuils terrestres :**

L'écureuil tamia rayé de Sibérie, un écureuil à nez long, l'écureuil de terre, ...

